【4-7 評価シート エビデンス総体】

診療ガイドライン	HBOC診療ガイドライン
対象	*BRCA1/2*変異を有する乳癌患者
介入	タモキシフェン内服
対照	タモキシフェン未内服

エビデンスの強さはRCTは"強(A)"からスタート、観察研究は弱(C)からスタート
* 各ドメインは"高(-2)"、"中/疑い(-1)"、"低(0)"の3段階
** エビデンスの強さは"強(A)"、"中(B)"、"弱(C)"、"非常に弱(D)"の4段階
*** 重要性はアウトカムの重要性(1～9)

エビデンス総体

								リスク人数(アウトカム率)											
アウトカム	**研究デザイン/研究数**	**バイアスリスク***	**非一貫性***	**不精確***	**非直接性***	**その他(出版バイアスなど)***	**上昇要因(観察研究)***	**対照群分母**	**対照群分子**	**(%)**	**介入群分母**	**介入群分子**	**(%)**	**効果指標(種類)**	**効果指標統合値**	**信頼区間**	**エビデンスの強さ****	**重要性*****	**コメント**
新規乳癌発症リスク(対側乳癌) BRCA1/2	Cohort/Case Control 1/2	-2	0	0	-1	0	0	1242	391	31.5	358	75	20.9	RR	0.56	95%CI 0.41-0.76	弱(C)		リスク人数はMetcalf (2004)記載なく除く
新規乳癌発症リスク(対側乳癌) BRCA1	Cohort/Case Control 2/2	-2	0	0	-1	0	0	2309	693	30.1	629	80	12.7	RR	0.47	95%CI 0.37-0.60	弱(C)		リスク人数はMetcalf (2004)記載なく除く
新規乳癌発症リスク(対側乳癌) BRCA2	Cohort/Case Control 2/2	-2	0	0	-1	0	0	499	204	40.9	566	62	11	RR	0.39	95%CI 0.28-0.54	弱(C)		リスク人数はMetcalf (2004)記載なく除く

BRCA1/2 (+)

コメント(該当するセルに記入)